



Papillomavirus (HPV)

Les papillomavirus (HPV) constituent un groupe de virus très répandu : plus de 120 sérotypes sont identifiés et séquencés, dont plus de 40 peuvent provoquer des infections des muqueuses génitales (principalement le col de l'utérus et le vagin), anales et même de l'oropharynx (la partie la plus interne de la bouche). L'utilisation de préservatifs n'élimine pas complètement le risque d'infection puisque ces virus peuvent également se transmettre lors de contacts génitaux sans pénétration.

Certains sérotypes (par exemple 6 et 11) sont responsables des condylomes, lésions bénignes, douloureuses, plates ou verruqueuses (condylomes acuminés ou crêtes-de-coq), localisées chez l'homme et la femme au niveau génital et/ou anal. D'autres sérotypes (par exemple 16 et 18) peuvent provoquer des altérations des muqueuses génitales, anales et de l'oropharynx qui, si elles persistent et ne sont pas traitées, peuvent se transformer en tumeurs au bout de plusieurs années. Les HPV sont responsables de tous les cancers du col de l'utérus et d'un certain nombre de cancers de l'anus, du vagin, du pénis, de la vulve et de l'oropharynx.

Si l'infection par le papillomavirus est très fréquente, elle est dans la plupart des cas transitoire et régresse spontanément sans provoquer de maladie. Lorsque l'infection évolue vers une maladie, il est possible d'intervenir grâce à des traitements efficaces.


Mais à ce jour, il n'existe aucun traitement permettant d'éliminer définitivement le virus de l'organisme.

POUR EN SAVOIR PLUS,
VISITER LE SITE
guidaservizi.saluter.it
CHERCHER HPV

LA RÉGION D'ÉMILIE-ROMAGNE GARANTIT LA VACCINATION GRATUITE AUX JEUNES FILLES ÂGÉES DE 12 À 26 ANS, AUX GARÇONS ÂGÉS DE 12 À 18 ANS, AUX PERSONNES SÉROPOSITIVES, AUX HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES (HSH), AUX TRAVAILLEURS DU SEXE, AUX PERSONNES DEVANT PRENDRE DES MÉDICAMENTS IMMUNOMODULATEURS OU IMMUNOSUPPRESSEURS ET AUX FEMMES AYANT RÉCEMMENT SUBI UN TRAITEMENT POUR DES LÉSIONS LIÉES AU HPV.

LES PERSONNES QUI N'APPARTIENNENT PAS À CES CATÉGORIES PEUVENT ACCÉDER À LA VACCINATION MOYENNANT UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DANS LES CENTRES DE VACCINATION DES HÔPITAUX.

EN OUTRE, POUR LA PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS, LA RÉGION D'ÉMILIE-ROMAGNE A MIS EN PLACE DEPUIS 1996 UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE ACTIF ET GRATUIT POUR TOUTES LES FEMMES ÂGÉES DE 25 À 64 ANS. ACTUELLEMENT, LES FEMMES ÂGÉES DE 25 À 29 ANS ONT LA POSSIBILITÉ D'EFFECTUER UN FROTTIS VAGINAL TOUS LES 3 ANS, TANDIS QUE LES FEMMES ÂGÉES DE 30 À 64 ANS ONT LA POSSIBILITÉ D'EFFECTUER LE TEST HPV TOUS LES 5 ANS.



**NB :
IL EXISTE UN VACCIN
EFFICACE ET SANS
DANGER POUR LA
PRÉVENTION DES
INFECTIONS PAR LE
HPV.**