



# Herpes genital

Está causado por un virus (virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2) que provoca lesiones circunscritas en las mucosas y la piel.

Las lesiones cutáneas se caracterizan por la aparición de pequeñas vesículas agrupadas que se transforman en úlceras y posteriormente en costras, mientras que las lesiones mucosas se presentan como erosiones agrupadas. El dolor y la picazón son intensos.

En las mujeres, el herpes genital se localiza principalmente en los labios mayores y menores, pero también son posibles lesiones en la vagina y el cuello del útero que pueden asociarse con secreción serosa o blanquecina.

En los hombres las lesiones afectan principalmente a la zona del glande y al prepucio, pero también pueden afectar al ano y a la zona inmediatamente circundante.

**Tanto en hombres como en mujeres, el herpes genital puede afectar la piel de la zona genital, del pubis, de las ingles y del perineo (es decir, la zona que contiene el escroto o la vulva y llega hasta el cóccix).** Además, puede haber lesiones localizadas en otras partes del cuerpo. La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona que elimina el virus de las lesiones, pero también puede ocurrir cuando las lesiones no son visibles.

MÁS INFORMACIONES EN EL SITIO WEB  
[guidaservizi.saluter.it](http://guidaservizi.saluter.it)  
BUSCAR HERPES GENITAL

**Las lesiones se curan en 1-4 semanas.** Sin embargo, dado que después de la primera infección, el virus permanece en el organismo durante toda la vida en estado de reposo y puede reactivarse periódicamente, la enfermedad tiende a reaparecer (recidiva) con una frecuencia que varía de persona a persona, en particular a causa de condiciones que determinan estrés psicofísico y/o depresión del sistema inmunológico.

**PARA LA TERAPIA ESTÁN DISPONIBLES MEDICAMENTOS ANTIVIRALES, QUE DEBEN TOMARSE POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA. NINGÚN TRATAMIENTO ES CAPAZ DE ELIMINAR EL VIRUS DEL ORGANISMO, LA TERAPIA ES ÚTIL PARA ATENUAR LOS SÍNTOMAS Y REDUCIR LA DURACIÓN DE LA FASE AGUDA DE LA ENFERMEDAD. LA INFECCIÓN QUE CONTRAE EL NIÑO EN EL MOMENTO DEL PARTO PUEDE SER PARTICULARMENTE GRAVE (HERPES NEONATAL).**



**RECUERDE:  
SE ENCUENTRAN  
DISPONIBLES  
MEDICAMENTOS  
ESPECÍFICOS ÚTILES  
PARA EL  
TRATAMIENTO.**