



تقييم المخاطر

منذ سنوات، تجري الأبحاث لتحديد الأجنة المعرضة لخطر الإصابة بأمراض الكروموسومات دون اللجوء إلى الأساليب الغازية (بزل السلى وأخذ عينات من الزغابات المشيمية): فهذه، في الواقع، مع ضمان التشخيص وبالتالي الاستجابة المؤكدة، ليست خالية من المخاطر.

ولذلك فإن اتجاه التقييم هو قصر هذه التحقيقات على حالات محددة وكفحص متعمق بعد اختبارات أخرى. لفهم إمكانيات الفحص المتاحة بشكل أفضل وتوجيهك بين الأساليب والتوقيت، أنشأت الوحدة الطبية USL Toscana Centro استشارة تسمى "الوصول إلى فحوصات ما قبل الولادة، والتي يتم حجزها من قبل قابلة العيادة عند تسليم كتيب الحمل.

> من الأفضل أن تكون برفقة شريك حياتك وأن تعلمي مسبقاً بوجود مشاكل في أسرتك، وخاصة المشاكل ذات النوع الخلقي. حتى الآن، تقدم منطقة توسكانا الاختبار المجمع باعتباره اختبارًا أساسيًا مجانيًا لجميع النساء: "التركيبة" لعمر الأم، وجرعة بعض علامات الدم (hCG وPAPP-A) وتقييمات تخطيط الصدى الطبي (الشفافية القفوية) تسمح بحساب خطر هذا الحمل المحدد أن يتأثر الجنين بالنثلث الصبغي 13،18،21.

يمثل الاختبار الموسع امتدادًا للاختبار المشترك، ويسمح لك بحساب خطر الإصابة بأمراض الحمل من جانب الأم: تسمم الحمل المبكر. يتم إجراؤه باستخدام عينة دم إضافية وفحص تخطيط الصدى الطبي والذي يقوم أيضًا بتقييم المعلمات الأخرى (قياس تدفق شرايين الرحم). هذا الاختبار غير مدر ج في كتيب الحمل الإقليمي، وبالتالي فهو يخضع لرسوم.

إذا سلط الاختبار المشترك الضوء على وجود خطر "متوسط" أو "عالي"، يتم اقتراح اختبار NIPT (اختبار ما قبل الولادة غير الجراحي): باستخدام عينة دم، من الممكن اكتشاف أجزاء من الحمض النووي المشيمي الموجود في دم الأم وتحليلها من أجل تحديدها و تسليط الضوء على خطر الشذوذات الكروموسومية. يتضمن هذا الاستطلاع تقاسم التكلفة - أي أن هناك تذكرة يدفعها المستخدم. وبدلاً من ذلك، أو كتحقيق إضافي بعد نتيجة فحص NIPT الإيجابية، يمكن إجراء تحقيق جراحي.

منطقة إمبولي، مستشفى سان جوزيبي، فيالي جيوفاني بوكاتشيو، 16 - إمبولي(FI)

منطقة فاورنسا ببيرو بالاجي فيالي مايكل أنجيولو، 41 - فلورنسا

منطقة براتو، مستشفى إس ستيفانو، شارع الأخت نيكولينا ممرضة ، - 20براتو

منطقة بيستويا مركز صحة المرأة بيستويا بيازا إس بارتولوميو 5 مركز صحة المرأة في مونتيكاتيني عبر القديس. ماركو 40