



السيلان (أو التفريغ)

تسببه جرثومة النيسرية البنية أو المكورات البنية، والتي تصيب المسالك البولية السفلية عند الرجال والمسالك البولية والتناسلية عند النساء. ويمكن أن يؤثر أيضاً على فتحة الشرج والبلعوم لدى الرجال والنساء.

تسبب العدوى مشاكل مؤلمة في التبول وإفرازات بيضاء مصفرة من القضيب أو المهبل. عندما تكون موضعية في فتحة الشرج، قد تحدث إفرازات بيضاء صفراء وحكة في الشرج ونزيف من فتحة الشرج وألم في البطن.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند النساء، يمكن أن تسبب العدوى، التي غالباً ما تكون بدون أعراض، إذا لم يتم علاجها، التهاباً في الأعضاء التناسلية، مع انخفاض في الخصوبة.

يمكن للمرأة الحامل المصابة بالعدوى في فترة حملها أن تنقل العدوى إلى الجنين أثناء الولادة؛ تكون العدوى الوليدية الناتجة موضعية بشكل رئيسي في العين، ولكن تم أيضاً وصف حالات التهاب المفاصل والتهاب السحايا وعدوى القلب.

يتم علاج مرض السيلان
بالأدوية المضادة للبكتيريا.
يجب إعطاء العلاج
أيضاً إلى شريك
الشخص المصاب

اكتشف المزيد على الموقع
Guidaservizi.saluter.it
ابحث عن مرض السيلان