



Gonorrea

Es causada por un germen, *Neisseria gonorrhoeae* o gonococo, **que infecta el tracto urinario inferior en los hombres y el tracto urinario y genital en las mujeres**. También puede afectar al recto y la faringe tanto en hombres como en mujeres.

La infección causa trastornos dolorosos en la micción (al orinar) y secreciones de color blanco amarillento del pene o de la vagina. Cuando se localiza en el recto, pueden producirse pérdidas de color blanco amarillento, picazón anal, sangrado del ano y dolores abdominales.

Cabe subrayar que, en las mujeres, la infección, a menudo asintomática, si no se trata puede provocar inflamación de los órganos genitales, con reducción de la fertilidad.

Una mujer embarazada con una infección en curso puede transmitir la infección al bebé durante el parto; la infección neonatal resultante se localiza principalmente en el ojo, pero también se han descrito casos de artritis, meningitis e infección cardíaca.

**RECUERDE:
LA GONORREA SE
CURA CON
ANTIBIÓTICOS; EL
TRATAMIENTO
TAMBIÉN DEBE SER
ADMINISTRADO A LA
PAREJA DE LA
PERSONA INFECTADA.**

MÁS INFORMACIONES EN EL SITIO WEB
guidaservizi.saluter.it
BUSCAR GONORREA