



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



prog.3863

Chlamydia Trachomatis

Questo germe è responsabile di uretriti e nella donna di infezioni del collo dell'utero.

Nella donna le infezioni non danno alcun sintomo in circa il 70% dei casi, mentre nell'uomo è più facile che si manifestino sintomi.

Quando presenti, i sintomi sono simili a quelli della gonorrea: dolore nell'urinare, perdite di colore trasparente, bianco o giallastro dal pene o dalla vagina.

La diagnosi è spesso effettuata quando l'infezione si è complicata, nell'uomo con una prostatite e nella donna con una salpingite o con l'infiammazione pelvica, evento che può portare alla riduzione della fertilità.

L'infezione da Chlamydia trachomatis può interessare anche la faringe e il retto a seguito di rapporti orali o anali.

**RICORDA:
QUESTE INFEZIONI
SI CURANO CON ANTIBIOTICI
DA SOMMINISTRARE
ANCHE AL PARTNER
DELLA PERSONA INFETTA.**

SCOPRI DI PIÙ SUL SITO
guidaservizi.saluter.it
CERCA **CHLAMYDIA**