



وزارة الداخلية

الزهري أو اللوي

هو مرض ناتج عن جرثومة اللولبية الشاحبة، والتي تنتقل عن طريق الإفرازات المصابة.

تتركز معظم الآفات الناجمة عن مرض الزهري في الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج أو الفم.

يتطور المرض في مراحل مختلفة. يظهر في الغالب في المرحلة الأولية (الزهري الأولي) على شكل قرحة تقع عادة في عنق الرحم أو القضيب أو منطقة الشرج، وترتبط بتضخم الغدد الليمفاوية القريبة من منطقة العدوى، مثل الغدد الليمفاوية الأربية.

لا يدرك الناس دائماً أنهم مصابون بالآفات لأنها في كثير من الأحيان لا تكون مؤلمة ولا تسبب الحكة. يمكن أن ينتقل مرض الزهري بسهولة من هذه المرحلة من المرض.

قد يظهر في الأشكال الأكثر تقدماً طفح جلدي وأضرار لاحقة في العظام والكبد والقلب والدماغ.

اكتشف المزيد على الموقع

Guidaservizi.saluter.it

ابحث عن مرض الزهري



يمكن أن تؤدي العدوى التي تحدث أثناء الحمل أو الولادة إلى الإجهاض، ووفاة الأطفال حديثي الولادة، والولادة المبكرة لحديثي الولادة ذوي الوزن المنخفض و/أو الإصابة بمرض معمم مع تلف الجهاز العصبي، والصمم، وتشوهات العظام.

يتم التشخيص من خلال اختبار دم بسيط. يتم علاج مرض الزهري بالمضادات الحيوية.

