



Sífilis o Lue

Es una enfermedad causada por un germen, el *Treponema pallidum*, que se transmite a través de secreciones infectadas.

Las lesiones causadas por la sífilis se localizan principalmente en los genitales, en el ano-recto o en la boca.

La enfermedad se desarrolla en diferentes fases o estadios. En la fase inicial (sífilis primaria) se presenta mayormente como una úlcera localizada comúnmente en el cuello uterino, el pene o la zona anal, asociada con un agrandamiento de los ganglios linfáticos cercanos a la zona de la infección, como los ganglios linfáticos inguinales.

Las personas no siempre se dan cuenta de que tienen lesiones porque con frecuencia no duelen ni pican. La sífilis se puede transmitir fácilmente desde esta etapa de la enfermedad.

En las formas más avanzadas pueden aparecer erupciones cutáneas y daños posteriores en los huesos, el hígado, el corazón y el cerebro.

MÁS INFORMACIONES EN EL SITIO WEB
guidaservizi.saluter.it
BUSCAR **SÍFILIS**

La infección contraída durante el embarazo o el parto puede provocar aborto espontáneo, muerte neonatal, nacimiento prematuro de recién nacidos con bajo peso y/o afectados por enfermedad generalizada con daños al sistema nervioso, sordera, malformaciones óseas.

**EL DIAGNÓSTICO SE REALIZA CON UN SIMPLE ANÁLISIS DE SANGRE.
LA SÍFILIS SE CURA CON ANTIBIÓTICOS.**



**RECUERDE:
¡ES IMPORTANTE
UN DIAGNÓSTICO
TEMPESTIVO CON
UN SIMPLE
ANÁLISIS DE
SANGRE!**