



Сифилис или Люэс

Это заболевание, вызываемое микробом бледная Трепонема (*Treponema pallidum*) и передающееся через инфицированные выделения.

Поражение, вызванные сифилисом, чаще всего локализуются на половых органах, аноректальной области или во рту .

Заболевание имеет разные фазы и стадии развития.

В начальной фазе (Первичный сифилис) он чаще всего проявляется в виде язвы, обычно расположенной на шейке матки, половом члене или в анальной области, связанной с увеличением лимфатических узлов, близких к зоне заражения, например паховых лимфатических узлов.

Люди не всегда осознают, что у них есть эти поражения, потому что они часто не вызывают ни боли, ни зуда. Сифилис легко передается на этой стадии заболевания.

В более запущенных формах могут появиться кожные высыпания и последующие поражения костей, печени, сердца и головного мозга.

Подробнее узнайте на сайте:

guidaservizi.saluter.it

Поиск: **Сифилис**

Инфекция, поразившая во время беременности или родов, может вызвать выкидыш, внутриутробную гибель плода, преждевременные роды младенцев с низкой массой тела и/или врождённую патологию поражающую нервную систему, а также глухоту и плохое развитие костной ткани.

Диагноз ставится с помощью простого анализа крови.
антибиотиками.

Сифилис лечат

ПОМНИТЕ:

очень важна своевременная диагностика с помощью простого анализа крови!