



Virus del Papiloma (VPH)

Los virus del papiloma (VPH) son un grupo de virus muy extendido: se conocen más de 120 serotipos, de los cuales más de 40 pueden provocar infecciones de las mucosas genitales (principalmente del cuello uterino y la vagina), del ano e incluso de la orofaringe (la parte más interna de la boca). La transmisión de estos virus también puede ocurrir a través de contactos genitales que no implican penetración, por lo que el uso del preservativo no elimina por completo el riesgo de contraer la infección.

Algunos serotipos (por ejemplo, 6 y 11) son responsables de las verrugas genitales, lesiones benignas dolorosas, planas o de tipo verrugoso (condilomas acuminados o crestas de gallo), localizadas, tanto en hombres como en mujeres, a nivel genital y/o anal. Otros serotipos (por ejemplo, 16 y 18) pueden provocar alteraciones de las mucosas genitales, anales y orofaríngeas que, si persisten y no se tratan, podrían evolucionar a tumores a lo largo de muchos años. Los VPH son responsables de todos los cánceres de cuello uterino y de un porcentaje de los de ano, vagina, pene, vulva y orofaringe.

La infección por VPH es muy frecuente, pero en la mayoría de los casos es transitoria y disminuye espontáneamente sin causar enfermedad. En los casos en que la infección evolucione a enfermedad, es posible intervenir con terapias eficaces.


Sin embargo, hasta la fecha no existen tratamientos disponibles que puedan eliminar permanentemente los virus del organismo.

MÁS INFORMACIONES EN EL SITIO WEB
guidaservizi.saluter.it
BUSCAR VPH

LA REGIÓN DE EMILIA-ROMAÑA GARANTIZA LA VACUNACIÓN GRATUITA A LAS MUCHACHAS DE 12 A 26 AÑOS, A MUCHACHOS DE 12 A 18 AÑOS, A PERSONAS VIH POSITIVAS, A HOMBRES QUE PRACTICAN SEXO CON HOMBRES (HSH), A PERSONAS DEDICADAS A LA PROSTITUCIÓN (TRABAJADORES SEXUALES), A QUIENES DEBEN TOMAR MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES O INMUNOSUPRESORES Y A LAS MUJERES QUE RECIENTEMENTE SE HAN SOMETIDO A TRATAMIENTOS POR LESIONES RELACIONADAS CON EL VPH.

QUIENES NO PERTENECEN A ESTAS CATEGORÍAS PUEDEN ACCEDER A LA VACUNACIÓN CON COSTOS COMPARTIDOS EN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA USL.

PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, DESDE 1996 LA REGIÓN EMILIA-ROMAGNA OFRECE, ADEMÁS, ACTIVA Y GRATUITAMENTE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN A TODAS LAS MUJERES DE 25 A 64 AÑOS. ACTUALMENTE, A LAS MUJERES DE 25 A 29 AÑOS SE LES OFRECE LA PRUEBA DE PAPANICOLAU CADA 3 AÑOS, MIENTRAS QUE A LAS MUJERES DE 30 A 64 AÑOS SE LES OFRECE LA PRUEBA DE VPH CADA 5 AÑOS.



**RECUERDE:
ESTÁ DISPONIBLE
UNA VACUNA
EFICAZ Y SEGURA
PARA LA
PREVENCIÓN DE
LAS INFECCIONES
POR VPH**