

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЛАНКУ СОГЛАСИЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19**ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 1****Вакцина COVID-19 Moderna****Что представляет собой вакцина COVID-19 Moderna и для чего она применяется**

Вакцина COVID-19 Moderna используется для предотвращения COVID-19 - заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 Moderna назначается взрослым в возрасте 18 лет и старше. Вакцина заставляет иммунную систему (естественные защитные силы организма) вырабатывать антитела и клетки крови, которые работают против вируса, обеспечивая защиту от COVID-19. Так как вакцина COVID-19 Moderna не содержит вирус, от нее Вы не сможете заразиться COVID-19.

Что нужно знать перед получением вакцины COVID-19 Moderna

Вакцину COVID-19 Moderna не следует принимать, если у Вас аллергия на действующее вещество или на любой из других компонентов (перечисленных ниже) этого препарата.

Предупреждения и меры предосторожности

Обратитесь к своему врачу или медицинскому работнику в центре вакцинации перед применением вакцины, если:

- ранее у Вас возникала тяжелая аллергическая реакция или проблемы с дыханием после введения какой-нибудь другой вакцины или после получения вакцины COVID-19 Moderna;
- Вы теряли сознание после инъекции;
- Вы болеете или у Вас острая инфекция и высокая температура. Тем не менее, вакцинацию можно провести, если у Вас небольшая температура или инфекция верхних дыхательных путей (например, простуда);
- у Вас часто бывают кровотечения или спонтанно образуются синяки, или если Вы принимаете медикаменты для предотвращения образования сгустков крови;
- у Вас ослабленная иммунная система из-за такого заболевания, как ВИЧ-инфекция, или из-за лекарств, влияющих на иммунную систему, таких как кортикостероиды.

Другие лекарственные препараты и вакцина COVID-19 Moderna

Сообщите своему врачу или медицинскому работнику центра вакцинации, если Вы принимаете, недавно принимали или могли принимать какие-либо другие лекарства или если Вам недавно были сделаны какие-либо другие прививки.

Беременность и кормления грудью

Если Вы беременны, полагаете, что беременны, планируете беременность либо кормите грудью, перед вакцинацией проконсультируйтесь с врачом.

Данные, касающиеся использования вакцины COVID-19 Moderna беременными женщинами, ограничены. Исследования вакцины на животных не выявили прямых или косвенных неблагоприятных эффектов на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие. Применение вакцины COVID-19 Moderna при беременности следует рассматривать только в том случае, если потенциальная польза перевешивает потенциальный риск для матери и плода.

Продолжительность защиты и ограничения эффективности вакцины

Продолжительность защиты, обеспечиваемой вакциной, неизвестна; клинические испытания для установления этого факта продолжаются. Как это бывает со всеми вакцинами, прививка вакциной COVID-19 Moderna может не защитить всех вакцинированных лиц. Вакцинированные люди могут не быть полностью защищены в течение 14 дней после введения второй дозы вакцины. Поэтому очень важно продолжать строго следовать рекомендациям общественного здравоохранения (маска, дистанцирование и частое мытье рук).

Как вводится вакцина COVID-19 Moderna

Вакцина COVID-19 Moderna вводится в виде внутримышечной инъекции в плечо. Необходима ревакцинация; рекомендуется вводить вторую дозу той же вакцины через 4 недели (и в любом случае не позднее 42 дней) после введения первой дозы для завершения курса вакцинации.

Для достижения оптимального иммунного ответа очень важно, чтобы было выполнено введение второй дозы. Если Вы забыли прийти в назначенный день для получения второй дозы, обратитесь к своему врачу или в центр вакцинации, где была введена первая доза.

Возможные побочные эффекты

Как и любая другая вакцина, Moderna COVID-19 может вызвать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех людей. *Очень частые побочные эффекты* (могут встречаться у 1 из 10 человек):

- припухлость в области подмышек
- головная боль
- тошнота, рвота
- боль в мышцах, суставах и скованность
- боль или припухлость в месте инъекции
- чувство сильной усталости
- озноб, температура

Частые побочные эффекты (могут встречаться у 1 из 10 человек):

- кожная сыпь
- покраснение или крапивница в месте инъекции

Нечастые побочные эффекты (могут встречаться у 1 из 100 человек):

- зуд в месте инъекции

Редкие побочные эффекты (могут встречаться у 1 из 1 000 человек):

- временное одностороннее опущение лица (паралич Белла)
- опухание лица (может возникать у пациентов, прошедших косметологические инъекции в области лица)

Неизвестная частота возникновения (частота не может быть определена на основе имеющихся данных): тяжелая аллергическая реакция, гиперчувствительность.

При возникновении каких-либо побочных эффектов, даже если они не указаны выше, обратитесь к своему лечащему врачу или в центр, проводивший вакцинацию.

Вы также можете сообщить о побочных эффектах непосредственно через национальную систему информирования (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>).

Что содержит вакцина COVID-19 Moderna

Действующим веществом является мРНК-вакцина против COVID-19.

Другие компоненты: липид SM-102, холестерин, 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC), 1,2-димиристоил-гас-глицеро-3-метоксиполиэтиленгликоль-2000 (PEG2000 DMG), трометамин, гидрохлорид трометамина, уксусная кислота, тригидрат ацетата натрия, сахароза, вода для инъекций.